

澳洲兒童傷害的十項關鍵資料

1. 每年約有**300**名澳洲兒童 (0-14歲) 由於非故意傷害而喪生，**6萬**名兒童因此入院。此類事件常被稱為「意外事故」。而實際上這些事故可以透過簡單的方法避免。

2. 傷害是0至14歲澳洲兒童死亡的主要原因，接近該年齡段死亡人數的一半。死於傷害的兒童人數，多於死於癌症、哮喘和傳染性疾病兒童人數的總和。

3. 傷害是僅次於哮喘等呼吸疾病的第二大兒童入院主因。

4. 兒童傷害造成澳洲每年約**15億**澳元的開支。每年僅在西澳的直接醫院費用就超過**1千4百萬**澳元。



5. 非故意傷害約佔**所有兒童傷害死亡原因的95%**，因傷害而死亡的兒童中，僅有**5%**的兒童是死於虐待、暴力、自殺和疏忽。

6. 自從**1979**年以來，兒童傷害死亡人數已減半，由每日兩個下降至每日一個。儘管已達到較好的進步，Kidsafe估計，透過實行已知的安全措施，每年還應可進一步避免**80宗**死亡個案和**2萬宗**入院個案。



7. 5歲以下的**幼童**受到非故意傷害的**風險最大**，死亡人數約佔所有兒童傷害死亡人數的一半。

8. 兒童受非故意傷害而死亡的最常見原因是：

- 車禍
- 走路時被車撞
- 溺水，尤其是幼童在家庭泳池中溺水
- 房屋火災

以上四個原因導致了**75%**的兒童傷害死亡。

9. 幼童受非故意傷害而入院的最常見原因是：

- 跌落，例如從護理設備上跌落
- 中毒，例如藥物或家用清潔劑中毒
- 燙傷，例如被熱飲品/食物和水喉熱水燙傷
- 窒息和被狗咬

學齡兒童入院的主要原因是：

- 跌落，例如從操場設備，尤其是為5至9歲兒童而設的設備上跌落
- 割傷和刺傷，例如兒童跌落時穿過玻璃板而被割傷
- 乘車受傷
- 走路受傷

10. 幼童**最常見**的受傷地點是在家中。隨著兒童長大，在操場、運動場等社區設施和在學校以及路上的傷害增多。確保我們家居、**道路和社區**的安全對保證兒童安全十分重要。



幫助保證兒童安全的六個家居要點

我們的家居有多安全？

四分之三的幼童嚴重傷害個案發生在你認為對他們最安全的地方——他們的家中。

嘗試對照以下的家居安全特點列表檢查你的家居有多安全：

1. 泳池（和按摩浴設備）全部圍起，並配有保養良好、能自動關閉的門。

為什麼？

幼童溺水過程極快而且無聲。每年大約 20 名 5 歲以下的幼童在無圍欄的泳池或圍欄與大門保養得不好的泳池溺水。

2. 浴室的熱水溫度調校在50°。

為什麼？

熱水如同火一樣滾燙。許多澳洲家庭水喉流出的熱水溫度高得足以在 1 秒內燙傷兒童的皮膚。

3. 在樓梯和火爐欄上要有門等障礙物，避免兒童受傷。

為什麼？

從樓梯和臺階上跌落十分常見，由於幼童的頭部較重，經常發生頭部受傷。嬰兒和學步幼童不明白什麼是「熱」。明亮的顏色——如火焰的顏色——會吸引他們的注意，在探索世界的過程中，他們可能會觸摸熱的表面。

4. 在儲存藥物、清潔劑、火柴和打火機等危險物件的櫥櫃上安裝防兒童開啟的裝置。

為什麼？

幼童十分好奇，不知道什麼是危險。告訴他們“不要碰”並不足以保證他們的安全。要將危險的物品安全地存放在他們觸摸不到的地方。



5. 安裝煙霧報警器，並定期測試，每年換一次電池。

為什麼？

家庭火災每年仍在奪走澳洲人的生命。幼童較為危險，因為他們需要成年人的及時拯救。煙霧報警器提供的報警可能會是生存的關鍵。

6. 玩耍區以圍欄與街道和車道隔開。

為什麼？

車輛和兒童不可混在一起。幼童不害怕車輛，司機也不易看見他們。幾乎每個月都會有一個學步幼童在車道上被倒車車輛撞倒而身亡。

Kidsafe 估計，如果澳洲家庭能夠做到以上六點，就可避免 5 歲以下兒童超過一半的傷害死亡、以及數以千計的兒童受傷入院。

如需瞭解令家居更安全的進一步資料，請與西澳兒童安全協會 (Kidsafe WA) 聯絡。



西澳兒童安全協會 (Kidsafe WA) © 2005

本文內容可供摘錄作教育用途。全文複製則需獲得書面准許。

更多資訊 電話 (08) 9340 8509

兒童安全資訊專線 電話 1800 802 244

中毒資訊中心 電話 13 11 26

www.kidsafewa.com.au

本說明印刷贊助：

